

Удаление потовых желез - лечение гипергидроза подмышечных впадин (повышенного потоотделения)

Многие люди страдают повышенным потоотделением в области подмышечных впадин, так называемого гипергидроза подмышечных впадин. Это происходит вне зависимости от времени года или дня, вне зависимости от физической активности. Тем временем, существуют относительно щадящие методы лечения для устранения этой неприятной проблемы. Одна из возможностей - это инъекция токсина ботулизма, вещества, хорошо зарекомендовавшего себя в устранении морщин. При этом достигается многомесячный результат. Более долговременное решение предлагает оперативное удаление потовых желёз (липосакция потовых желёз), которое, в принципе, очень похоже на обыкновенную липосакцию, проводящуюся с использованием специальных канюль. Применение этого метода возможно только в области подмышечных впадин, но не на руках или ногах.

Как проводится удаление потовых желёз / липосакция потовых желёз?

Вмешательство проводится амбулаторно под местной анестезией. Через 2 специальных миниразреза в зоне роста волос подмышечной впадины подкожно вводится специальный раствор, содержащий в том числе и местный анестетик. Далее через специальные канюли высасываются потовые железы. И в заключении на две недели накладывается компрессионная повязка.

После операции

Нити, которыми были зашиты минишвы, могут быть удалены через неделю после операции. Никаких ограничений, кроме регулярного измерения температуры тела, не накладывается. Удалённые потовые железы снова не вырастают, так что можно ожидать долговременного уменьшения потоотделения.

Удаление потовых желез - краткая ин- формация

Продолжительность операции:

- приблизительно 2-3 часа

Послеоперационный период

- ношения компрессионной повязки в течении 2-х недель

Вид наркоза:

- местная анестезия

Пребывание в стационаре клиники

- амбулаторно